VOL I
EDICIÓN IV

RIESGO AGROCLIMÁTICO ARROZ

ABRIL 2019



Síntesis

En la costa norte, predominaría riesgo bajo debido a que las precipitaciones estarían cercanas a lo normal. Las temperaturas máxima y mínima estarían entre valores normales e inferiores a lo normal, lo cual favorecería la etapa de floración.

En la costa sur, el riesgo agroclimático tendría valores entre muy bajo y bajo; debido a la ausencia de precipitaciones y a que las temperaturas estarían cercanas a lo normal. Estas condiciones favorecerían la maduración córnea del cultivo.

En la selva norte occidental, la ocurrencia de precipitaciones inferiores a lo normal podrían retrasar el desarrollo del cultivo; por lo cual el riesgo agroclimático está entre muy bajo y medio.

El descenso de la temperatura diurna podría retrasar la cosecha del arroz en las localidades de la costa y selva donde todavía no ha culminado la etapa de maduración del grano.

Próxima Actualización: mayo de 2019

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi 50 años
EL PERÚ PRIMERO